

PRIMA DELL'USO LEGGERE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che può essere usato per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

Per maggiori informazioni e consigli rivolgersi al farmacista.

Consultare il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.



## TANTUM VERDE®

0,15% COLLUTORIO

BENZIDAMINA CLORIDRATO

### CHE COSA È

Tantum Verde collutorio, utilizzato per uso orofaringeo, è un farmaco antinfiammatorio non steroideo con proprietà analgesica, che combatte il dolore che si accompagna all'infiammazione a carico della gola, della bocca e delle gengive.

Tantum Verde collutorio manifesta anche proprietà disinfettanti e azione anestetica di superficie.

### PERCHÈ SI USA

Tantum Verde collutorio si usa per il trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti), anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva.

### QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

Ipersensibilità verso la benzidamina o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

### PRECAUZIONI PER L'USO

Non sono necessarie particolari precauzioni d'uso.

### QUALI MEDICINALI O ALIMENTI POSSONO MODIFICARE L'EFFETTO DEL MEDICINALE

Informare il medico o farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi medicinale anche quelli senza prescrizione.

### E' IMPORTANTE SAPERE CHE

Dopo breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

L'uso di Tantum Verde collutorio, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione.

In tal caso, interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire idonea terapia.

In un numero limitato di pazienti le ulcerazioni oro-faringee possono essere segno di patologie più gravi.

Pertanto, nel caso in cui i sintomi dovessero perdurare per più di tre giorni, il paziente deve rivolgersi al proprio medico o dentista a seconda delle necessità.

L'uso della benzidamina è sconsigliato in pazienti con ipersensibilità all'acido acetil-

salilico o ad altri FANS.

Tantum Verde collutorio deve essere somministrato con cautela in soggetti che in passato hanno avuto episodi di asma bronchiale, in quanto in questo tipo di pazienti potrebbero intervenire fenomeni di bronco-spasmo.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcool etilico, può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicata da alcune federazioni sportive.

### Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Tantum Verde non dovrebbe essere utilizzato in gravidanza e allattamento. In caso di necessità deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. Consultare il medico se si sospetta uno stato di gravidanza o se si desidera pianificare una maternità.

### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

L'uso di Tantum Verde collutorio, alle dosi consigliate, non altera la capacità di guida né l'utilizzo di macchinari.

### Informazioni importanti su alcuni eccipienti di Tantum Verde collutorio

Tantum Verde collutorio contiene paraidrosibenzozati che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate).

### NOTE DI EDUCAZIONE SANITARIA

Alcune condizioni ambientali, quali abbassamento o sbalzi di temperatura, innalzamento del tasso di umidità, ecc., possono provocare l'infiammazione delle prime vie respiratorie, perché favoriscono l'attacco da parte dei germi patogeni.

La sintomatologia caratteristica delle infiammazioni delle prime vie respiratorie (bocca, naso, gola) comprende, fra l'altro, senso di bruciore e dolore alla gola con difficoltà di deglutizione.

Per non aggravare tali sintomi, è utile evitare alcuni fattori ulteriormente irritanti quali il

(segue)

fumo, l'aria secca, lo smog, i luoghi affollati, ecc.

Anche le gengive possono essere sede di infiammazione.

Quest'ultima potrebbe addirittura essere una spia di problemi odontoiatrici in fase iniziale: in questo caso, potrebbe essere utile un controllo dal dentista.

Inoltre, a seguito di terapie odontoiatriche di tipo conservativo, estrazioni dentarie, piccoli interventi di chirurgia odontoiatrica, le gengive ed il cavo orale possono essere sede di arrossamenti, infiammazioni e dolore.

Tutte queste situazioni possono essere superate più rapidamente utilizzando anche un collutorio con specifica attività antinfiammatoria, analgesica ed anestetica di superficie.

#### **COME USARE QUESTO MEDICINALE**

##### **Quanto**

15 ml, 2-3 volte al giorno, in forma pura o diluita.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

##### **Quando e per quanto tempo**

Consultare il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

##### **Come**

Versare nel bicchierino dosatore 15 ml di Tantum Verde collutorio, utilizzare in forma pura o diluita (in questo caso aggiungere nel bicchierino dosatore 15 ml d'acqua).



#### **COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE**

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Tantum Verde collutorio, avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Tantum Verde rivolgersi al medico o al farmacista.

#### **EFFETTI INDESIDERATI**

Come tutti i medicinali, Tantum Verde può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti non comuni (colpiscono da 1 a 10 utilizzatori su 1.000): fotosensibilità.

Effetti rari (colpiscono da 1 a 10 utilizzatori su 10.000): bruciore e secchezza della bocca, reazioni di ipersensibilità.

Effetti molto rari (colpiscono meno di 1 utilizzatore su 10.000): laringospasmo, angioedema.

Effetti con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazioni anafilattiche.

*Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.*

*Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.*

#### **SCADENZA E CONSERVAZIONE**

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

**ATTENZIONE:** non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

I medicinali non devono essere gettati nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al farmacista come eliminare i medicinali che non sono più utilizzati. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

#### **COMPOSIZIONE**

100 ml contengono: *principio attivo:* benzidamina cloridrato g 0,15 (pari a g 0,134 di benzidamina); *eccipienti:* glicerolo, etanolo (96 per cento), saccarina, metile paraidrosibenzoato, sodio bicarbonato, aroma menta, polisorbato 20, giallo chinolina (E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata.

#### **COME SI PRESENTA**

Tantum Verde 0,15% si presenta come collutorio in flacone di vetro da 120 o 240 ml con bicchierino dosatore.

#### **TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.A.  
Viale Amelia 70, 00181 Roma

#### **PRODUTTORE**

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio, 22 - 60131 Ancona

#### **REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO:**

Ottobre 2010

  
**ANGELINI**