

Il sodio benzoato può avere un'azione blandamente irritante sulla pelle e sulle mucose.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

#### 5. Come conservare Neo Borocillina pastiglie senza zucchero

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Non usi questo medicinale se la confezione è stata aperta o danneggiata.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservi sia la scatola che il foglio illustrativo.

#### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

##### Cosa contiene Neo Borocillina pastiglie senza zucchero

- I principi attivi sono 2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato. Una pastiglia contiene 1,2 mg di 2,4 diclorobenzil alcool e 20 mg (equivalente a 17 mg di acido benzoico) di sodio benzoato.
- Gli altri componenti sono: magnesio stearato, silice colloidale idrata, levomentolo, menta essenza, eucaliptolo, citrale, peppermint, aspartame, mannitolo granulare (contenente mannitolo e polivinilpirrolidone), mannitolo.

##### Descrizione dell'aspetto di Neo Borocillina pastiglie senza zucchero e contenuto della confezione

Neo Borocillina pastiglie senza zucchero si presenta in forma di pastiglie.

Il contenuto della confezione è di 16, 18, 20 pastiglie. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

##### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Alfasigma S.p.A. - Via Ragazzi del '99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Produttore:

Alfasigma S.p.A. - Via E. Fermi, n. 1 - 65020 Alanno (PE)

##### Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il

Ottobre 2019

**ALFASIGMA** 

42004989

#### Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

neo **Borocillina**

1,2 mg + 20 mg pastiglie senza zucchero  
2,4 diclorobenzil alcool, sodio benzoato

#### Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 7 giorni.

#### Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è Neo Borocillina pastiglie senza zucchero e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina pastiglie senza zucchero
3. Come usare Neo Borocillina pastiglie senza zucchero
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Neo Borocillina pastiglie senza zucchero
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### 1. Che cos'è Neo Borocillina pastiglie senza zucchero e a cosa serve

Neo Borocillina pastiglie senza zucchero contiene i principi attivi 2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato ed appartiene ad una categoria di farmaci detti antisettici (antibatterici) del cavo orofaringeo (bocca e gola), utilizzati per la cura dei sintomi delle malattie infiammatorie della bocca e della gola.

Il 2,4 diclorobenzil alcool e il sodio benzoato svolgono un'azione antisettica (antibatterica) locale del cavo orale. Inoltre il sodio benzoato contribuisce a rendere più fluide le secrezioni (catarro) delle vie respiratorie.

Le pastiglie di Neo Borocillina pastiglie senza zucchero, dal gradevole sapore, sono indicate come disinfettante del cavo orofaringeo (bocca e gola) e danno una piacevole sensazione di fresco.

Neo Borocillina pastiglie senza zucchero:

- ha un'azione disinfettante e antibatterica nei confronti di numerosi germi che possono provocare malattie del cavo orale
- ha un'azione battericida rapida (elimina i batteri) ed ha un effetto prolungato

Neo Borocillina pastiglie senza zucchero può essere utilizzata da chi deve evitare di assumere saccarosio (zucchero) ed è quindi particolarmente adatta per quei soggetti che devono controllare l'apporto di zuccheri e di calorie durante la giornata.

Inoltre, non contenendo zucchero, Neo Borocillina pastiglie senza zucchero non provoca l'insorgenza di carie dentale.

## **2. Cosa deve sapere prima di usare Neo Borocillina pastiglie senza zucchero**

### **NON usi Neo Borocillina pastiglie senza zucchero**

- se è allergico al 2,4 diclorobenzil alcool o al sodio benzoato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6)
- nei bambini di età inferiore ai due anni con predisposizione al laringospasmo (contrazione dei muscoli della laringe) e alle convulsioni
- se è affetto da una rara malattia detta fenilchetonuria perché contiene aspartame

### **Avvertenze e precauzioni**

L'impiego, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale può dare origine a fenomeni di allergia. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico.

### **Bambini**

Neo Borocillina pastiglie senza zucchero non deve essere usata in bambini di età inferiore ai due anni con predisposizione alle convulsioni e al laringospasmo (contrazione dei muscoli della laringe), perché contiene levomentolo.

Nei bambini di età superiore ai due anni usi questo medicinale con precauzione e sotto il diretto controllo del medico.

### **Altri medicinali e Neo Borocillina pastiglie senza zucchero**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Eviti di assumere altri medicinali disinfettanti della bocca e della gola insieme a Neo Borocillina pastiglie senza zucchero.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

In gravidanza e durante l'allattamento, Neo Borocillina pastiglie senza zucchero deve essere usata solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico, perché non esistono dati attendibili sull'uso di 2,4 diclorobenzil alcool e sodio benzoato durante la gravidanza e l'allattamento.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare un veicolo o sull'uso di macchinari.

### **Neo Borocillina pastiglie senza zucchero contiene aspartame**

Questo medicinale contiene 10 mg di aspartame per pastiglia. L'aspartame è una fonte di fenilalanina. Può esserle dannosa se è affetto da fenilchetonuria, una rara malattia genetica che causa l'accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.

### **Neo Borocillina pastiglie senza zucchero contiene sodio**

Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per pastiglia, cioè è essenzialmente 'senza sodio'.

## **3. Come usare Neo Borocillina pastiglie senza zucchero**

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

Una pastiglia da sciogliere lentamente in bocca ogni 2 - 3 ore fino ad un massimo giornaliero di 8 pastiglie.

Non superi le dosi indicate.

Le pastiglie vanno sciolte lentamente in bocca per mantenere il più a lungo possibile la mucosa del cavo orofaringeo sotto l'azione del medicinale.

Consulti il medico se non nota risultati apprezzabili dopo breve periodo di trattamento (non superiore ai 7 giorni).

### **Se prende più Neo Borocillina pastiglie senza zucchero di quanto deve**

Avverta immediatamente il medico o si rivolga all'ospedale più vicino in caso di ingestione accidentale di una dose superiore a quella raccomandata per l'assunzione giornaliera di questo medicinale.

## **4. Possibili effetti indesiderati**

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Effetti indesiderati molto rari:

- reazioni allergiche (ipersensibilità),
- sensazione di giramento di testa,
- difficoltà a respirare (insufficienza respiratoria),
- gonfiore alla gola (edema alla glottide),
- vomito,
- malessere,
- sudorazione,
- gonfiore (edema) delle braccia,
- gonfiore della bocca, delle palpebre, del volto,
- orticaria,
- danneggiamento dei globuli rossi e conseguente anemia (anemia emolitica),
- colorazione gialla della pelle e degli occhi (ittero).