

PRIMA DELL'USO

LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

*per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista

* consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

CANESTEN 1% POLVERE CUTANEA

clotrimazolo

Che cos'è

CANESTEN è un antimicotico (antifungino) per uso dermatologico, agisce cioè localmente eliminando i funghi della pelle.

Perché si usa

CANESTEN polvere cutanea si usa per il trattamento delle micosi (funghi) della pelle e delle pieghe cutanee, (ad esempio: tinea pedis o piede d'atleta, tinea cruris, tinea inguinalis).

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità al principio attivi o ad uno degli eccipienti

Quando può essere usato solo dopo aver consultato il medico.

Gravidanza (vedere cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento).

E' opportuno consultare il medico anche nei casi in cui tali disturbi si fossero manifestati in passato (recidive di micosi).

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

In gravidanza Canesten deve essere usato solo dopo aver consultato il medico e aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso.

Precauzioni per l'uso

Nelle dermatiti da pannolino, si sconsiglia l'impiego di pannolini ad effetto occlusorio dopo l'applicazione del farmaco.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Non sono noti medicinali o alimenti che possano modificare l'effetto del medicinale.

E' importante sapere che

L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione con manifestazioni eritematose (rossore localizzato) e prurito.

In tal caso è necessario interrompere il trattamento e consultare il medico o il farmacista.

In caso di recidive, consultare il medico.

Note di educazione sanitaria

Per prevenire la micosi e le sue recidive è utile seguire alcune norme di carattere igienico sanitario, quali:

- Nei luoghi pubblici come piscine, palestre, camere di albergo etc. evitare di camminare a piedi nudi.
- Per chi pratica sport è importante utilizzare calzature traspiranti e comode, le cui solette plantari dovrebbero essere cambiate o lavate periodicamente.
- Limitare l'utilizzo di indumenti contenenti fibre sintetiche.
- Nel neonato, evitare il ristagno di urina o feci sulla cute cambiando frequentemente il pannolino.
- Sottoporre cani e gatti a visita veterinaria prima di accoglierli nell'ambiente domestico.
- Qualora un membro della famiglia manifesti una micosi è consigliabile osservare ulteriori precauzioni igieniche, come tenere separati gli indumenti e lavarli ad elevata temperatura.

Come usare questo medicinale

Canesten[®] polvere cutanea è elettivamente indicato per il trattamento delle zone coperte o scarsamente aerate della pelle e delle pieghe cutanee.

Quanto

Canesten polvere cutanea va applicato in piccole quantità 2-3 volte al giorno, in corrispondenza delle zone affette.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

In genere, per la scomparsa delle manifestazioni, è sufficiente un periodo di trattamento di 3-4 settimane.

Al fine di consolidare i risultati terapeutici ottenuti ed evitare reinfezioni, è opportuno proseguire la terapia con Canesten per almeno 2 settimane dopo la scomparsa delle manifestazioni.

Dopo 3-4 settimane di impiego continuativo senza risultati apprezzabili, consultare il medico.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come

Canesten polvere cutanea va applicato dopo aver lavato ed asciugato accuratamente la zona interessata.

Nel piede d'atleta si consiglia di cospargere con Canesten polvere cutanea anche l'interno delle calze e delle scarpe.

Cosa fare se avete applicato una dose eccessiva di medicinale

Non si sono riscontrate segnalazioni di effetti tossici del clotrimazolo, riferibili ad applicazioni di dosi eccessive del medicinale.

In caso di ingestione accidentale di Canesten polvere cutanea avvertire immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

Cosa fare se avete dimenticato di prendere una o più dosi

Continuare il trattamento come da posologia consigliata.

Effetti dovuti alla sospensione del trattamento

Nessun effetto.

Effetti indesiderati

Raramente sono possibili, in un numero molto limitato di pazienti, lievi manifestazioni di intollerabilità locale quali leggero rossore e/o prurito, che tuttavia scompaiono rapidamente.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e Conservazione

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

La data di scadenza si intende per il prodotto in confezionamento integro , correttamente conservato

Composizione

100 G CONTENGONO:

principio attivo : clotrimazolo 1 g

eccipienti: amido di riso

Come si presenta

Canesten si presenta in forma di polvere cutanea.

Il contenuto della confezione è di 30 g.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Bayer S.p.A. - Viale Certosa 130 - Milano

Produttore e controllore finale

Bayer S.p.A. - Officina di produzione di Garbagnate Milanese (MI)

Tenere il medicinale fuori dalla portata e dalla vista dei bambini

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

Ultima revisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco ÷ 4.07