

# Broxo <sup>Din</sup> 200 mg/100 g gel gengivale

## clorexidina digluconato



**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo alcuni giorni.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Che cos'è Broxo Din e a che cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare Broxo Din
3. Come usare Broxo Din
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Broxo Din
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

## **1. Che cos'è Broxo Din e a che cosa serve**

Broxo Din è un disinfettante della mucosa della bocca, contenente clorexidina digluconato che è una sostanza antibatterica.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio dopo alcuni giorni.

## **2. Cosa deve sapere prima di usare Broxo Din**

### **Non usi Broxo Din**

- se è allergico al principio attivo o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).

### **Avvertenze e precauzioni**

- Non usare per trattamenti prolungati; consultare il medico se dopo alcuni giorni di trattamento non nota miglioramenti.
- L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso locale (topico) può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione (eccessiva reazione dell'organismo a sostanze estranee con cui è venuto in contatto). In tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico per iniziare una terapia adatta.
- Il prodotto è solo per uso esterno e quindi non deve essere ingerito.
- Evitare il contatto con gli occhi.

### **Altri medicinali e Broxo Din**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Evitare l'uso contemporaneo di altri disinfettanti e detergenti.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico prima di usare questo medicinale.

### **Guida di veicoli e utilizzo di macchinari**

Non pertinente.

### **Broxo Din gel gengivale contiene nipagina (metile paraidrossibenzoato).**

Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

### 3. Come usare Broxo Din

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

La dose raccomandata è:

- due applicazioni al giorno fino a riduzione dell'irritazione;
- successivamente una applicazione al giorno alla sera, prima di coricarsi.

Modo d'uso:

Istruzioni per l'apertura

1. Ruotare il tappo in senso antiorario (verso sinistra), rimuoverlo ed eliminare l'anello presente alla sua base.
2. Avvitare il tappo in senso orario (verso destra), in modo da forare l'estremità sigillata del tubetto.

Massaggiare lentamente le gengive per circa 1 minuto con 2 cm di gel gengivale.

Il prodotto può essere applicato con le dita o impiegando uno spazzolino morbido.

#### Se usa più Broxo Din di quanto deve

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Broxo Din 200 mg/100 g gel gengivale **avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.**

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

È possibile il verificarsi, in qualche caso, di bruciore o irritazione (intolleranza), peraltro privi di conseguenze, che non richiedono modifica del trattamento.

#### Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista.

Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili](http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili).

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

### 5. Come conservare Broxo Din

Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Tenere questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola dopo "Scadenza". La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

### 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

#### Cosa contiene Broxo Din

- Il principio attivo è la clorexidina digluconato.
- Gli altri componenti sono: gel vegetale malva, gel vegetale camomilla, mentolo, idrossietilcellulosa, sorbitolo liquido non cristallizzabile, saccarina sodica, nipagina (metile paraidrossibenzoato), colorante blu patentato V, acqua depurata.

#### Descrizione dell'aspetto di Broxo Din e contenuto della confezione

Broxo Din si presenta come gel gengivale in un tubo da 30 ml.

#### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

Laboratorio Farmaceutico SIT S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)

**Questo foglio illustrativo è stato aggiornato: aprile 2015**



Laboratorio Farmaceutico SIT s.r.l.  
Via Cavour, 70 - 27035 Mede (PV)