

PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Questo è un medicinale di automedicazione che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico.

Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurre gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista.
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

BRIOVITASE
450 mg + 450 mg
polvere per sospensione orale

Composizione

Una bustina di polvere contiene:

Aspartato di magnesio tetraidrato	450 mg
Aspartato di potassio emiidrato	450 mg

Eccipienti:

Acido citrico, pectina, aroma cedro, aroma limone, aroma arancio, aspartame, saccarosio.

Come si presenta

BRIOVITASE si presenta in forma di polvere per sospensione orale.

Il contenuto della confezione è di 10, di 14 o di 20 bustine monodose.

Che cosa è

BRIOVITASE è un integratore di sali minerali.

Titolare dell'autorizzazione all'Immissione in Commercio:

MONTEFARMACO OTC S.p.A. - Via IV Novembre, 92 - 20021 Bollate (MI)

Produttore e Controllore Finale:

1) LAMP S. PROSPERO S.p.A. - Via della Pace 25/A- 41030 S. Prospero S/S (Modena). Il controllo del contenuto di potassio e magnesio può essere effettuato anche presso: BIOLAB S.p.A. - Via B. Buozzi, 2 - Vimodrone.

2) SIGMAR Italia S.p.a, Via Sombreno, 11- 24011 Almè (BG).

Perché si usa

BRIOVITASE è indicato in tutti gli stati di carenza di potassio e di magnesio, che si manifestano generalmente con una sensazione di stanchezza, debolezza muscolare e crampi. Tali carenze possono essere provocate da una eccessiva sudorazione, intensa attività fisica, diarree e vomito profusi.

Quando non deve essere usato

Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

La somministrazione di alte dosi di aspartato di potassio e di magnesio è controindicata in presenza di grave insufficienza renale o surrenalica. Stati individuali di disidratazione acuta. Miotonia congenita.

Cosa fare durante la gravidanza e l'allattamento

BRIOVITASE può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Precauzioni per l'uso

Occorre prudenza nel trattamento di pazienti cardiopatici con insufficienza renale.

Il prodotto contiene saccarosio e quando assunto in accordo alla posologia consigliata ogni dose fornisce 3,7 g di saccarosio.

Non è adatto nei casi di intolleranza ereditaria al fruttosio, di sindrome da malassorbimento di glucosio e galattosio e di deficienza di saccarasi e isomaltasi.

Il prodotto contiene una fonte di fenilalanina.

Quali medicinali o alimenti possono modificare l'effetto del medicinale

Nessuno

Come usare questo medicinale

Quanto

Adulti: 2 bustine di polvere per sospensione orale al giorno.

Attenzione: non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico.

Quando e per quanto tempo

Occorrono circa 4 giorni di terapia prima di poter notare un miglioramento clinico soggettivo. Si consiglia di continuare la somministrazione di BRIOVITASE per almeno 2 settimane.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

Come

Sciogliere il contenuto della bustina in un bicchiere d'acqua.

Cosa fare se avete preso una dose eccessiva di medicinale

L'ingestione di BRIOVITASE, anche di molto superiore a quella consigliata, non dovrebbe indurre disturbi gravi.

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di BRIOVITASE avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

Effetti indesiderati

Disturbi addominali, nausea, vomito e diarrea sono stati riportati occasionalmente. Questi sintomi possono scomparire somministrando il prodotto in giusta dose dopo i pasti.

Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati.

E' importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo.

Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli Effetti Indesiderati disponibile in farmacia (modello B).

Scadenza e conservazione

Vedere la data di scadenza indicata sulla confezione. Tale data si intende per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Tenere il medicinale fuori dalla portata dei bambini.

E' importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglietto illustrativo.

Revisione del Foglietto illustrativo da parte del Ministero della Salute: dicembre 2004

MONTEFARMACO OTC S.p.A. – Bollate (MI)